FAST FACTS

Enfermedad de [redacted]

¿Qué es la enfermedad de [redacted] y qué la causa?

La enfermedad de [redacted] es una enfermedad bacteriana transmitida por garrapatas. La enfermedad puede variar pero por lo general involucra una erupción cutánea y dolor articular (artritis). La enfermedad tiene lugar a nivel mundial y en todos los EE.UU. Los estados con mayor número de casos se encuentran en el noreste y en la región central alta.

¿Qué animales pueden contraer la enfermedad de [redacted]?

Los perros, caballos y ocasionalmente ganado bovino pueden contraer la enfermedad de [redacted] El venado de cola blanca, los ratones, las ardillas rayadas, las ardillas grises, las zarigüeyas y mapaches también pueden verse infectados.

¿Cómo puede mi animal contraer la enfermedad de [redacted]?

La enfermedad de [redacted] se transmite a través de la picadura de una garrapata infectada (vector). Mamíferos salvajes, especialmente roedores pequeños y venados, puede transportar la bacteria por naturaleza. Las garrapatas contraen la bacteria cuando se alimenta (de sangre) de los animales salvajes infectados. La garrapata entonces puede transmitir la bacteria a otros animales (como por ejemplo mascotas) o humanos cuando se alimentan (pican).

¿Cómo afecta la enfermedad de [redacted] a mi animal?

Con frecuencia, los mamíferos salvajes infectados con la bacteria no mostrarán ningún signo de la enfermedad. En perros, los signos de la enfermedad pueden tardar entre 2 a 5 meses en aparecer. Se pueden detectar cojera y dolor articular (artritis). La "rodilla" y el "codo" son las articulaciones más comúnmente afectadas y la cojera puede afectar una pata y luego otras o aparecer y desaparecer (intermitente). Los perros también pueden evidenciar fiebre. La enfermedad, por lo general, sana por sí sola; algunos casos puede ser de largo plazo. En muy pocas ocasiones, la bacteria puede afectar a los riñones o al corazón, lo cual puede generar la muerte del animal. Los signos de la enfermedad se evidencian con muy poca frecuencia en caballos y ganado bovino pero involucran cojera o rigidez.

Fotos de venado (reservorio) y garrapata (vector) de la enfermedad de [redacted] El recuadro muestra el agente bacteriano.

¿Puedo contraer la enfermedad de [redacted]?

Sí. Las personas pueden contraer la enfermedad de [redacted] a través de la picadura de una garrapata infectada (vector). La garrapata debe fijarse durante al menos 24 horas para transmitir la bacteria. Las garrapatas inmaduras, llamadas ninfas, son mucho más chicas que las garrapatas adultas y son la fuente de transmisión principal de la enfermedad de Lyme en humanos.

La enfermedad de [redacted] en humanos puede variar entre la no ocurrencia de signos de la enfermedad a una enfermedad severa. Los signos pueden comenzar entre 1 a 2 semanas luego de la infección (picadura de la garrapata). Primero, se puede ver una protuberancia roja pequeña en el lugar de la picadura de la garrapata. Lentamente se desarrolla y se expande en una erupción extensa circular del tipo ojo de buey. No todas las personas infectadas muestran esta erupción. Otros signos pueden incluir fiebre, dolores corporales, rigidez de cuello y dolor de cabeza.

La segunda etapa de la enfermedad tiene lugar unas semanas o meses después. Involucra dolor en una o más articulaciones, la rodilla es el sitio más común. El dolor aparece y desaparece y las articulaciones pueden inflamarse. Esto puede continuar por años. Durante esta etapa pueden también desarrollarse varias erupciones "ojo de buey".

Última actualización: Junio 2006
© 2006 [redacted]
the Center for Food Security & Public Health
Iowa State University®

Enfermedad de [redacted]

Sólo casos raros involucran la propagación de la bacteria al cerebro o al corazón.

¿A quién debo contactar si sospecho el contagio con la enfermedad de [redacted]?

En animales –

Contacte a su veterinario.

En humanos –

Contacte a su médico.

¿[redacted]

Use medicamentos para la prevención de garrapatas. Mantenga a sus mascotas fuera de áreas forestales y del contacto con animales salvajes. Compruebe con frecuencia la presencia de garrapatas y quítelas de inmediato si las encuentra. Use guantes al retirar las garrapatas a fin de protegerse a sí mismo. Existe una vacuna disponible para perros en áreas de alto riesgo.

¿Cómo puedo protegerme de la enfermedad [redacted]

Evite áreas donde puedan existir las garrapatas (pila de hojas, áreas forestales, arbustos altos). Si ingresa a este tipo de áreas, use camisas manga larga, pantalones largos y zapatos de punta cerrada. La ropa de color claro le facilitará encontrar cualquier garrapata que tenga encima. Con frecuencia controle si usted o alguna otra persona tienen garrapatas, especialmente al dejar dicha área y quítelas de inmediato si las encuentra. Al tocar o quitar garrapatas, use guantes. Siempre lave sus manos luego de realizar esta operación.

[redacted]

© 2006 [redacted]

the Center for Food Security & Public Health
Iowa State University®